De Agosto

Número de identificación en la colección: 132
Procedencia: Senra (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 361 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA
Brotación (C3): 10 abril
Floración (F2): 2 mayo
Recolección (K): 9 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y medio
Cavidad peduncular (profundidad y anchura): profunda y media
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo: ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta