

Desconocida

Número de identificación en la colección: 136

Procedencia: Burricios (A Coruña)

Latitud: 43° 13'

Longitud: 8° 10'

Altitud: 219 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 9 abril

Floración (F2): 2 mayo

Recolección (K): 13 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: a rayas, intensidad fuerte

Forma: plana-globosa

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: parcialmente plegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): muy profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y corto

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): profunda y ancha

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: suave

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: acidez media-baja

Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: ancha

Longitud de las estípulas: larga

Máxima anchura de las estípulas: ancha

Denticulación del borde del limbo: biserrado

Forma del ápice del limbo: mucronado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: larga

Anchura de los pétalos: ancha

Disposición de los pétalos: superpuestos entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta