

Desconocida

Número de identificación en la colección: 150

Procedencia: Herbón (A Coruña)

Latitud: 42° 44'

Longitud: 8° 39'

Altitud: 60 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 29 marzo

Floración (F2): 8 abril

Recolección (K): 26 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: completa, intensidad fuerte

Forma: plana

Tamaño: pequeño

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y corto

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha

Color de la pulpa: crema

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: jugosa

Sabor: media

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: corta

Máxima anchura del limbo: estrecha

Longitud de las estípulas: corta

Máxima anchura de las estípulas: desconocido

Denticulación del borde del limbo: ondulado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: ataque débil

Raíces aéreas: ataque débil

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta