

De Invierno

Número de identificación en la colección: 151

Procedencia: Herbón (A Coruña)

Latitud: 42° 44'

Longitud: 8° 39'

Altitud: 60 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 23 abril

Floración (F2): 14 mayo

Recolección (K): 27 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: intermedia-cónica

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: medianamente sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y estrecha

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y estrecha

Color de la pulpa: amarilla

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: larga

Máxima anchura del limbo: ancha

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: mucronado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: larga

Anchura de los pétalos: ancha

Disposición de los pétalos: superpuestos entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: ataque medio

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque fuerte

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta