De Agosto

Número de identificación en la colección: 163
Procedencia: Noia (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 10 m.

Destino: Mixta

FENOLOGIA
Brotación (C3): 5 abril
Floración (F2): 25 abril
Recolección (K): 5 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera elevada
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio
Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media-baja y dulce
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo: biserrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos entre sí
Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil