

Parecida a Tabardilla

Número de identificación en la colección: 166

Procedencia: Noia (A Coruña)

Latitud: 42° 46'

Longitud: 8° 53'

Altitud: 10 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 10 abril

Floración (F2): 4 mayo

Recolección (K): 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: a rayas, intensidad media

Forma: plana-globosa

Tamaño: medio

Epidermis: de textura rugosa, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula

Sensibilidad al russetting: muy sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y corto

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y media

Color de la pulpa: amarilla-crema

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: jugosa

Sabor: media

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: corta

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: corta

Máxima anchura de las estípulas: estrecha

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: ancha

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta