De Agosto

Número de identificación en la

colección: 167

Procedencia: Noia (A Coruña)

Latitud: 42° 46' Longitud: 8° 53' Altitud: 10 m. Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 18 abril Floración (F2): 8 mayo Recolección (K): 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: globoso-cónica Tamaño: grande

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera

media

Sensibilidad al russeting: poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas Disposición de los sépalos: erectos,

superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):

profunda y ancha

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho

y largo

Cavidad peduncular (profundidad y

anchura): media y media Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: jugosa Sabor: media

Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: larga

Máxima anchura del limbo: ancha Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo:

serrado

Forma del ápice del limbo: cuspidado Forma de la base del limbo: cordiforme Presencia de subestípulas: presentes CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: corta Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto

entre sí

Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y

ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio Moteado: no presenta Raíces aéreas: no presenta Momificado: no presenta Pulgón lanígero: ataque débil Pulgón verde: ataque medio Araña roja: no presenta Chancro: no presenta