

Desconocida

Número de identificación en la colección: 169

Procedencia: Noia (A Coruña)

Latitud: 42° 46'

Longitud: 8° 53'

Altitud: 10 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 20 abril

Floración (F2): 16 mayo

Recolección (K): 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: a rayas, intensidad media

Forma: globoso-cónica

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: variable, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: media

Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: larga

Máxima anchura del limbo: ancha

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: ondulado

Forma del ápice del limbo: cuspidado

Forma de la base del limbo: agudo

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: corta

Anchura de los pétalos: estrecha

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: ataque débil

Raíces aéreas: ataque débil

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta