

José Antonio

Número de identificación en la colección: 17

Procedencia: Lians (A Coruña)

Latitud: 43° 19'

Longitud: 8° 18'

Altitud: 58 m.

Destino: Mesa

FENOLOGÍA

Brotación (C3): 10 abril

Floración (F2): 3 mayo

Recolección (K): 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: a rayas, intensidad fuerte

Forma: plana-globosa

Tamaño: medio

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): poco profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y corto

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha

Color de la pulpa: blanca-amarilla

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: acidez media-baja y dulzor medio-bajo

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: desconocido

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: ancha

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta