

Cacharela o Tres en Cunca

Número de identificación en la colección: 172

Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)

Latitud: 42° 46'

Longitud: 8° 53'

Altitud: 129 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 26 abril

Floración (F2): 23 mayo

Recolección (K): 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: sin chapa

Forma: oblongo-cónica

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: erectos, variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y estrecha

Color de la pulpa: crema

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: Crocante

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

Aroma: poco aroma, anisado

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: ancha

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: corta

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: ataque débil