

Muleiriña

Número de identificación en la colección: 173

Procedencia: Sta.M^a.Roo (A Coruña)

Latitud: 42° 46'

Longitud: 8° 53'

Altitud: 129 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 9 abril

Floración (F2): 28 abril

Recolección (K): 9 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: a rayas, intensidad fuerte

Forma: plana-globosa

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: Erectos convergentes, en contacto en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): poco profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y media

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: media

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: larga

Máxima anchura del limbo: ancha

Longitud de las estípulas: corta

Máxima anchura de las estípulas: ancha

Denticulación del borde del limbo: ondulado

Forma del ápice del limbo: cuspidado

Forma de la base del limbo: cordiforme

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta