

Tabardilla

Número de identificación en la colección: 174

Procedencia: Sta.M^a.Roo (A Coruña)

Latitud: 42° 46'

Longitud: 8° 53'

Altitud: 129 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 31 marzo

Floración (F2): 22 abril

Recolección (K): 29 agosto

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: oblonga

Tamaño: medio

Epidermis: de textura rugosa, con pruina en su superficie y con presencia de cera nula

Sensibilidad al russetting: sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha

Color de la pulpa: crema

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: agudo

Forma de la base del limbo: agudo

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: corta

Anchura de los pétalos: estrecha

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: ataque débil

Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta