

Tabardilla Antigua

Número de identificación en la colección: 175

Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)

Latitud: 42° 46'

Longitud: 8° 53'

Altitud: 129 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 7 abril

Floración (F2): 4 mayo

Recolección (K): 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: plana

Tamaño: medio

Epidermis: de textura rugosa, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula

Sensibilidad al russetting: sensible

Tamaño lenticelas: grandes

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): profunda y ancha

Color de la pulpa: crema-amarilla

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: acidez media

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: ancha

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: cuspidado

Forma de la base del limbo: redondeado

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: corta

Anchura de los pétalos: estrecha

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: ataque débil

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: ataque débil

Pulgón lanífero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta