

Peiro

Número de identificación en la colección: 176

Procedencia: Sta.M^a.Roo (A Coruña)

Latitud: 42° 46'

Longitud: 8° 53'

Altitud: 129 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 8 abril

Floración (F2): 27 abril

Recolección (K): 11 agosto

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: elíptico-cónica

Tamaño: pequeño

Epidermis: de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: erectos, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y estrecha

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y estrecha

Color de la pulpa: crema

Firmeza de la pulpa: suave

Textura de la pulpa: Crocante

Jugosidad: seca

Sabor: débil

Aroma: poco aroma, anisado

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: corta

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: larga

Máxima anchura de las estípulas: estrecha

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: larga

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: ataque débil

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: ataque débil

Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta