

Desconocida

Número de identificación en la colección: 179

Procedencia: Sta.M^a.Roo (A Coruña)

Latitud: 42° 46'

Longitud: 8° 53'

Altitud: 129 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 12 abril

Floración (F2): 3 mayo

Recolección (K): 26 agosto

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: a rayas, intensidad media

Forma: oblongo-cónica

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: grandes

Disposición de los sépalos: variable, libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y ancha

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): profunda y ancha

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: ancha

Denticulación del borde del limbo: ondulado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: agudo

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: desconocido

Anchura de los pétalos: desconocido

Disposición de los pétalos: desconocido

Longitud del pedúnculo: desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: ataque débil

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta