

Desconocida

Número de identificación en la colección: 183

Procedencia: Sta.M^a.Roo (A Coruña)

Latitud: 42° 46'

Longitud: 8° 53'

Altitud: 129 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 8 abril

Floración (F2): 2 mayo

Recolección (K): 6 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: completa, intensidad fuerte

Forma: globoso-cónica

Tamaño: medio

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: variable, variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y ancha

Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media

Color de la pulpa: verde

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: corta

Máxima anchura del limbo: estrecha

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: estrecha

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: cuspidado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: corta

Anchura de los pétalos: estrecha

Disposición de los pétalos: libres entre sí

Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: ataque débil

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: ataque débil

Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta