

## Do Cú Negro

**Número de identificación en la colección:** 185

**Procedencia:** Sta.M<sup>a</sup>.Roo (A Coruña)

**Latitud:** 42° 46'

**Longitud:** 8° 53'

**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

### FENOLOGIA

**Brotación (C3):** 9 abril

**Floración (F2):** 26 abril

**Recolección (K):** 8 octubre

### CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** amarillo

**Chapa:** a manchas, intensidad pálida

**Forma:** oblonga

**Tamaño:** pequeño

**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

**Sensibilidad al russetting:** medianamente sensible

**Tamaño lenticelas:** pequeñas

**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha

**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo

**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha

**Color de la pulpa:** amarilla

**Firmeza de la pulpa:** intermedia

**Textura de la pulpa:** intermedia

**Jugosidad:** intermedia

**Sabor:** débil

**Aroma:** aromática

### CARACTERES DE LA HOJA

**Longitud del limbo:** corta

**Máxima anchura del limbo:** estrecha

**Longitud de las estípulas:** media

**Máxima anchura de las estípulas:** media

**Denticulación del borde del limbo:** serrado

**Forma del ápice del limbo:** acuminado

**Forma de la base del limbo:** obtuso

**Presencia de subestípulas:** presentes

### CARACTERES DE LA FLOR

**Longitud de los pétalos:** larga

**Anchura de los pétalos:** media

**Disposición de los pétalos:** libres entre sí

**Longitud del pedúnculo:** media

### PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

**Oidio:** no presenta

**Moteado:** ataque débil

**Raíces aéreas:** ataque débil

**Momificado:** ataque débil

**Pulgón lanífero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta

**Araña roja:** no presenta

**Chancro:** no presenta