

## Tabardilla Blanca

**Número de identificación en la colección:** 187

**Procedencia:** Sta.Mª.Roo (A Coruña)

**Latitud:** 42° 46'

**Longitud:** 8° 53'

**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

### FENOLOGIA

**Brotación (C3):** 13 abril

**Floración (F2):** 3 mayo

**Recolección (K):** 24 septiembre

### CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** verde

**Chapa:** lavada, intensidad pálida

**Forma:** plana

**Tamaño:** pequeño

**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

**Sensibilidad al russetting:** poco sensible

**Tamaño lenticelas:** medianas

**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media

**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio

**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha

**Color de la pulpa:** blanca

**Firmeza de la pulpa:** intermedia

**Textura de la pulpa:** intermedia

**Jugosidad:** intermedia

**Sabor:** media

**Aroma:** poco aroma

### CARACTERES DE LA HOJA

**Longitud del limbo:** media

**Máxima anchura del limbo:** media

**Longitud de las estípulas:** media

**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha

**Denticulación del borde del limbo:** serrado

**Forma del ápice del limbo:** cuspidado

**Forma de la base del limbo:** obtuso

**Presencia de subestípulas:** presentes

### CARACTERES DE LA FLOR

**Longitud de los pétalos:** corta

**Anchura de los pétalos:** estrecha

**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí

**Longitud del pedúnculo:** media

### PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

**Oidio:** ataque fuerte

**Moteado:** no presenta

**Raíces aéreas:** no presenta

**Momificado:** no presenta

**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** no presenta

**Araña roja:** ataque débil

**Chancro:** no presenta