

Tres en Cunca

Número de identificación en la colección: 19

Procedencia: Andrade (A Coruña)

Latitud: 43° 24'

Longitud: 8° 10'

Altitud: 315 m.

Destino: Mesa

FENOLOGIA

Brotación (C3): 9 abril

Floración (F2): 1 mayo

Recolección (K): 4 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: plana-globosa

Tamaño: grande

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: variable, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: acidez baja y dulces

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: mucronado

Forma de la base del limbo: cordiforme

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: libres entre sí

Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: ataque débil

Chancro: no presenta