

Parecida a Repinaldo

Número de identificación en la colección: 198

Procedencia: Saidres (Pontevedra)

Latitud: 42° 41'

Longitud: 8° 14'

Altitud: 436 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 27 abril

Floración (F2): 10 mayo

Recolección (K): 3 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: plana-globosa

Tamaño: medio

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: medianamente sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media

Color de la pulpa: blanca-crema

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: acidez alta

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: larga

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: ondulado

Forma del ápice del limbo: cuspidado

Forma de la base del limbo: cordiforme

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: desconocido

Anchura de los pétalos: desconocido

Disposición de los pétalos: desconocido

Longitud del pedúnculo: desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: no presenta

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta