

Tres en Rama

Número de identificación en la colección: 205

Procedencia: Breixa (Pontevedra)

Latitud: 42° 41'

Longitud: 8° 14'

Altitud: 469 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 20 abril

Floración (F2): 14 mayo

Recolección (K): 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: globosa

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): poco profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): profunda y media

Color de la pulpa: blanca-crema

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: corta

Máxima anchura de las estípulas: desconocido

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: corta

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: no presenta

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta