

Morro de Liebre

Número de identificación en la colección: 210

Procedencia: Breixa (Pontevedra)

Latitud: 42° 41'

Longitud: 8° 14'

Altitud: 469 m.

Destino: Mesa

FENOLOGIA

Brotación (C3): 1 abril

Floración (F2): 28 abril

Recolección (K): 10 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: plana-globosa

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: variable, libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: jugosa

Sabor: acidez baja y dulce

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: desconocido

Máxima anchura del limbo: desconocido

Longitud de las estípulas: desconocido

Máxima anchura de las estípulas: desconocido

Denticulación del borde del limbo: desconocido

Forma del ápice del limbo: desconocido

Forma de la base del limbo: desconocido

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque fuerte

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: no presenta

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta