Fariñentas

Número de identificación en la colección: 217
Procedencia: Cristimil (Pontevedra)
Latitud: 42º 39'
Longitud: 8º 06'
Altitud: 496 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA
Brotación (C3): 18 abril
Floración (F2): 7 mayo
Recolección (K): 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y largo
Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: seca
Sabor: acidez media-baja
Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo: serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta