

Tres en Cunca y Otra

Número de identificación en la colección: 22

Procedencia: San Juan de Piñeiros (A Coruña)

Latitud: 43°26'

Longitud: 4°31'

Altitud: 92 m.

Destino: Mesa

FENOLOGIA

Brotación (C3): 3 abril

Floración (F2): 25 abril

Recolección (K): 5 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: plana-globosa

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: medianamente sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: completamente replegados, libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): muy profunda y ancha

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): profunda y ancha

Color de la pulpa: crema

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: no ácidas y dulces

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: corta

Máxima anchura de las estípulas: estrecha

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: larga

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque fuerte

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: ataque débil

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: ataque débil

Chancro: no presenta