Pero Repinaldo

Número de identificación en la colección: 220
Procedencia: Santeles de Abaixo (Pontevedra)
Latitud: 42º 47'
Longitud: 8º 29'
Altitud: 200 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA
Brotación (C3): 6 mayo
Floración (F2): 24 mayo
Recolección (K): 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y largo
Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo: biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta