Camoesa Fina

Número de identificación en la

colección: 29

Procedencia: Andrade (A Coruña)

Latitud: 43° 24' Longitud: 8° 10'

Altitud: 315 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 13 abril Floración (F2): 3 mayo

Recolección (K): 27 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: lavada, intensidad media

Forma: globoso-cónica Tamaño: pequeño

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera

media

Sensibilidad al russeting: muy poco

sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: corta

Máxima anchura del limbo: estrecha Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo:

biserrado

Forma del ápice del limbo: mucronado Forma de la base del limbo: redondeado Presencia de subestípulas: presentes

PRESENCIA DE PLAGAS Y

ENFERMEDADES **Oidio:** ataque medio

Moteado: no presenta Raíces aéreas: no presenta Momificado: no presenta Pulgón lanígero: no presenta Fosa calicina (profundidad y anchura):

profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y

largo

Cavidad peduncular (profundidad y

anchura): media y media Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto

entre sí

Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil Araña roja: no presenta Chancro: no presenta