

Repinaldo

Número de identificación en la colección: 304

Procedencia: Alfoz (Lugo)

Latitud: 43° 31'

Longitud: 7° 24'

Altitud: 80 m.

Destino: Mesa

FENOLOGIA

Brotación (C3): 23 marzo

Floración (F2): 20 abril

Recolección (K): 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: globoso-cónica

Tamaño: medio

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: parcialmente replgados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha

Color de la pulpa: crema-amarilla

Firmeza de la pulpa: suave

Textura de la pulpa: harinosa

Jugosidad: intermedia

Sabor: acidez baja y dulce

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: larga

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: larga

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: ondulado

Forma del ápice del limbo: cuspidado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: ataque medio

Raíces aéreas: ataque débil

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta