

## Tardía

**Número de identificación en la colección:** 311

**Procedencia:** Masma (Lugo)

**Latitud:** 43° 25'

**Longitud:** 7° 21'

**Altitud:** 100 m.

**Destino:** Sidra

FENOLOGIA

**Brotación (C3):** 9 abril

**Floración (F2):** 30 abril

**Recolección (K):** 22 octubre

### CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** amarillo

**Chapa:** lavada, intensidad pálida

**Forma:** plana-globosa

**Tamaño:** medio

**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

**Sensibilidad al russetting:** muy poco sensible

**Tamaño lenticelas:** grandes

**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media

**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo

**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media

**Color de la pulpa:** blanca

**Firmeza de la pulpa:** intermedia

**Textura de la pulpa:** intermedia

**Jugosidad:** jugosa

**Sabor:** acidez media-alta y no dulce

**Aroma:** poco aroma

### CARACTERES DE LA HOJA

**Longitud del limbo:** corta

**Máxima anchura del limbo:** media

**Longitud de las estípulas:** media

**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha

**Denticulación del borde del limbo:** serrado

**Forma del ápice del limbo:** acuminado

**Forma de la base del limbo:** cordiforme

**Presencia de subestípulas:** ausentes

### CARACTERES DE LA FLOR

**Longitud de los pétalos:** corta

**Anchura de los pétalos:** estrecha

**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí

**Longitud del pedúnculo:** media

### PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

**Oidio:** ataque medio

**Moteado:** ataque débil

**Raíces aéreas:** no presenta

**Momificado:** no presenta

**Pulgón lanífero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque débil

**Araña roja:** no presenta

**Chancro:** no presenta