

Tempera

Número de identificación en la colección: 327

Procedencia: Saá (Lugo)

Latitud: 43° 00'

Longitud: 7° 33'

Altitud: 520 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 10 abril

Floración (F2): 3 mayo

Recolección (K): 4 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: salpicada, intensidad media

Forma: plana-globosa

Tamaño: pequeño

Epidermis: de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: completamente replegados, en contacto en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y corto

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha

Color de la pulpa: blanca-amarilla

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: corta

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: corta

Máxima anchura de las estípulas: desconocido

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: superpuestos entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: ataque medio

Raíces aéreas: ataque medio

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta