

Desconocida

Número de identificación en la colección: 330

Procedencia: Recimil (Lugo)

Latitud: 43° 00'

Longitud: 7° 33'

Altitud: 481 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 17 marzo

Floración (F2): 13 mayo

Recolección (K): 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: a rayas, intensidad media

Forma: plana-globosa

Tamaño: pequeño

Epidermis: de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: variable, variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): muy profunda y ancha

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): profunda y media

Color de la pulpa: crema-amarilla

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: acidez media

Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: estrecha

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: cuspidado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: corta

Anchura de los pétalos: estrecha

Disposición de los pétalos: libres entre sí

Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: ataque medio

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta