

Parecida a Starking

Número de identificación en la colección: 332

Procedencia: Becerreá (Lugo)

Latitud: 42° 51'

Longitud: 7° 09'

Altitud: 641 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 10 abril

Floración (F2): 19 abril

Recolección (K): desconocido

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: lavada, intensidad media

Forma: oblonga

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: variable, variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: jugosa

Sabor: media

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: larga

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: ondulado

Forma del ápice del limbo: mucronado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: corta

Anchura de los pétalos: estrecha

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: ataque débil

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta