

Parecida a Carapanón

Número de identificación en la colección: 333

Procedencia: Rececende (Lugo)

Latitud: 43° 21'

Longitud: 7° 11'

Altitud: 200 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): desconocido

Floración (F2): 4 abril

Recolección (K): 20 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: a rayas, intensidad pálida

Forma: plana-globosa

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: medianamente sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y estrecha

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media

Color de la pulpa: crema

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: media

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: corta

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: corta

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: mucronado

Forma de la base del limbo: cordiforme

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: desconocido

Anchura de los pétalos: desconocido

Disposición de los pétalos: desconocido

Longitud del pedúnculo: desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: ataque débil

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta