

Desconocida

Número de identificación en la colección: 337

Procedencia: Louseiro (Lugo)

Latitud: 42° 46'

Longitud: 7° 24'

Altitud: 535 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 13 mayo

Floración (F2): 27 mayo

Recolección (K): 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: bicolor

Chapa: a rayas, intensidad media

Forma: globoso-cónica

Tamaño: medio

Epidermis: de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: acidez media-baja

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: larga

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: mucronado

Forma de la base del limbo: redondeado

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: corta

Anchura de los pétalos: estrecha

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta