

Espiño Mol

Número de identificación en la colección: 338

Procedencia: Louseiro (Lugo)

Latitud: 42° 46'

Longitud: 7° 24'

Altitud: 535 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): desconocido

Floración (F2): 2 mayo

Recolección (K): desconocido

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: sin chapa

Forma: globoso-cónica

Tamaño: medio

Epidermis: de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: variable, variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): poco profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: acidez media-baja

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: corta

Máxima anchura de las estípulas: desconocido

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta