

Tabardilla

Número de identificación en la colección: 344

Procedencia: Veiga(Santiago) (Lugo)

Latitud: 42° 46'

Longitud: 7° 24'

Altitud: 512 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): desconocido

Floración (F2): 29 marzo

Recolección (K): 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: sin chapa

Forma: plana-globosa

Tamaño: medio

Epidermis: de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula

Sensibilidad al russetting: sensible

Tamaño lenticelas: grandes

Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y ancha

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y ancha

Color de la pulpa: amarilla-crema

Firmeza de la pulpa: firme

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: estrecha

Longitud de las estípulas: corta

Máxima anchura de las estípulas: estrecha

Denticulación del borde del limbo: biondulado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: agudo

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: corta

Anchura de los pétalos: estrecha

Disposición de los pétalos: superpuestos entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta