

## De Invierno

**Número de identificación en la colección:** 349

**Procedencia:** Tor (S.Xulian) (Lugo)

**Latitud:** 42° 31'

**Longitud:** 7° 30'

**Altitud:** 364 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

### FENOLOGIA

**Brotación (C3):** 13 mayo

**Floración (F2):** 1 junio

**Recolección (K):** 15 octubre

### CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** bicolor

**Chapa:** lavada, intensidad media

**Forma:** plana-globosa

**Tamaño:** pequeño

**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

**Sensibilidad al russetting:** muy poco sensible

**Tamaño lenticelas:** medianas

**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha

**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto

**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha

**Color de la pulpa:** blanca

**Firmeza de la pulpa:** intermedia

**Textura de la pulpa:** intermedia

**Jugosidad:** intermedia

**Sabor:** débil

**Aroma:** poco aroma

### CARACTERES DE LA HOJA

**Longitud del limbo:** media

**Máxima anchura del limbo:** media

**Longitud de las estípulas:** corta

**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido

**Denticulación del borde del limbo:** serrado

**Forma del ápice del limbo:** cuspidado

**Forma de la base del limbo:** obtuso

**Presencia de subestípulas:** ausentes

### CARACTERES DE LA FLOR

**Longitud de los pétalos:** corta

**Anchura de los pétalos:** estrecha

**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí

**Longitud del pedúnculo:** media

### PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

**Oidio:** ataque débil

**Moteado:** ataque medio

**Raíces aéreas:** no presenta

**Momificado:** no presenta

**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio

**Araña roja:** no presenta

**Chancro:** no presenta