

Desconocida

Número de identificación en la colección: 352

Procedencia: Baamorto (Lugo)

Latitud: 42° 31'

Longitud: 7° 30'

Altitud: 364 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): desconocido

Floración (F2): desconocido

Recolección (K): 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: elíptico-cónica

Tamaño: medio

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: grandes

Disposición de los sépalos: variable, variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y ancha

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: media

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: larga

Máxima anchura del limbo: media

Longitud de las estípulas: larga

Máxima anchura de las estípulas: ancha

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: estrecha

Disposición de los pétalos: libres entre sí

Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: ataque medio

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta