

Desconocida

Número de identificación en la colección: 353

Procedencia: Baamorto (Lugo)

Latitud: 42° 31'

Longitud: 7° 30'

Altitud: 411 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): desconocido

Floración (F2): 5 abril

Recolección (K): 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: globoso-cónica

Tamaño: pequeño

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera elevada

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: variable, variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y estrecha

Color de la pulpa: blanca

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: media

Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: estrecha

Longitud de las estípulas: corta

Máxima anchura de las estípulas: desconocido

Denticulación del borde del limbo: biserrado

Forma del ápice del limbo: cuspidado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: larga

Anchura de los pétalos: estrecha

Disposición de los pétalos: libres entre sí

Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: ataque medio

Raíces aéreas: ataque débil

Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta