

Parecida a De Cera

Número de identificación en la colección: 355

Procedencia: Baamorto (Lugo)

Latitud: 42° 31'

Longitud: 7° 30'

Altitud: 411 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 6 abril

Floración (F2): 22 abril

Recolección (K): 12 agosto

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: plana-globosa

Tamaño: grande

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: pequeñas

Disposición de los sépalos: completamente replegados, libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y ancha

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y ancha

Color de la pulpa: blanca-crema

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: débil

Aroma: aromática, anisado

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: ancha

Longitud de las estípulas: larga

Máxima anchura de las estípulas: ancha

Denticulación del borde del limbo: ondulado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: redondeado

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: no presenta

Pulgón verde: no presenta

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta