

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 356

**Procedencia:** Tor (S.Xulian) (Lugo)

**Latitud:** 42° 31'

**Longitud:** 7° 30'

**Altitud:** 364 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

### FENOLOGIA

**Brotación (C3):** desconocido

**Floración (F2):** desconocido

**Recolección (K):** 22 octubre

### CARACTERES DEL FRUTO

**Color:** amarillo

**Chapa:** lavada, intensidad pálida

**Forma:** plana

**Tamaño:** pequeño

**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media

**Sensibilidad al russetting:** muy poco sensible

**Tamaño lenticelas:** medianas

**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha

**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio

**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media

**Color de la pulpa:** blanca

**Firmeza de la pulpa:** intermedia

**Textura de la pulpa:** intermedia

**Jugosidad:** intermedia

**Sabor:** débil

**Aroma:** poco aroma

### CARACTERES DE LA HOJA

**Longitud del limbo:** larga

**Máxima anchura del limbo:** ancha

**Longitud de las estípulas:** corta

**Máxima anchura de las estípulas:** media

**Denticulación del borde del limbo:** serrado

**Forma del ápice del limbo:** cuspidado

**Forma de la base del limbo:** obtuso

**Presencia de subestípulas:** ausentes

### CARACTERES DE LA FLOR

**Longitud de los pétalos:** desconocido

**Anchura de los pétalos:** desconocido

**Disposición de los pétalos:** desconocido

**Longitud del pedúnculo:** desconocido

### PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

**Oidio:** ataque débil

**Moteado:** ataque débil

**Raíces aéreas:** no presenta

**Momificado:** no presenta

**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque fuerte

**Araña roja:** no presenta

**Chancro:** ataque débil