

Belarda Blanca

Número de identificación en la colección: 358

Procedencia: Magazos (Lugo)

Latitud: 43° 39'

Longitud: 7° 35'

Altitud: 52 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA

Brotación (C3): 2 mayo

Floración (F2): 9 mayo

Recolección (K): 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: sin chapa

Forma: globoso-cónica

Tamaño: medio

Epidermis: de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: grandes

Disposición de los sépalos: variable, variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y largo

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media

Color de la pulpa: blanca-amarilla

Firmeza de la pulpa: intermedia

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: jugosa

Sabor: acidez media

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: media

Máxima anchura del limbo: ancha

Longitud de las estípulas: media

Máxima anchura de las estípulas: estrecha

Denticulación del borde del limbo: ondulado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: cordiforme

Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: corta

Anchura de los pétalos: estrecha

Disposición de los pétalos: en contacto entre sí

Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque débil

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: ataque débil

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: ataque medio

Pulgón verde: ataque débil

Araña roja: no presenta

Chancro: ataque débil