Sangre de Toro

Número de identificación en la colección: 366
Procedencia: Magazos (Lugo)
Latitud: 43º 39'
Longitud: 7º 35'
Altitud: 52 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA
Brotación (C3): 26 abril
Floración (F2): 13 mayo
Recolección (K): 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y medio
Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: estrecha
Denticulación del borde del limbo: serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta