Temprana

Número de identificación en la colección: 369
Procedencia: Cereixido (Lugo)
Latitud: 43º 07'
Longitud: 7º 03'
Altitud: 485 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA
Brotación (C3): 20 abril
Floración (F2): 15 mayo
Recolección (K): desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
Color: desconocido
Chapa: desconocido
Forma: desconocido
Tamaño: desconocido
Epidermis: pruina en su superficie y con presencia de cera
Sensibilidad al russeting: desconocido
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable, superpuestos en su base.
Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y largo
Cavidad peduncular (profundidad y anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: desconocido
Firmeza de la pulpa: desconocido
Textura de la pulpa: desconocido
Jugosidad: desconocido
Sabor: desconocido
Aroma: desconocido

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: desconocido
Denticulación del borde del limbo: biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta
Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta