Sangre de Toro

Número de identificación en la colección: 373
Procedencia: Vieiro (Ourense)
Latitud: 42º 08'
Longitud: 7º 57'
Altitud: 440 m.

Destino: Conservación en el Banco

FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 11 abril
Recolección (K): 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
Sensibilidad al russeting: muy poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y medio
Cavidad peduncular (profundidad y anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo: ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta