

Camoesa

Número de identificación en la colección: 41

Procedencia: Lians (A Coruña)

Latitud: 43° 19'

Longitud: 8° 18'

Altitud: 58 m.

Destino: Mesa

FENOLOGIA

Brotación (C3): 13 abril

Floración (F2): 2 mayo

Recolección (K): 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO

Color: amarillo

Chapa: lavada, intensidad pálida

Forma: plana-globosa

Tamaño: grande

Epidermis: de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media

Sensibilidad al russetting: muy poco sensible

Tamaño lenticelas: medianas

Disposición de los sépalos: variable, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura): poco profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho y medio

Cavidad peduncular (profundidad y anchura): poco profunda y estrecha

Color de la pulpa: amarilla-crema

Firmeza de la pulpa: suave

Textura de la pulpa: intermedia

Jugosidad: intermedia

Sabor: no ácidas y dulces

Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA

Longitud del limbo: larga

Máxima anchura del limbo: ancha

Longitud de las estípulas: larga

Máxima anchura de las estípulas: media

Denticulación del borde del limbo: serrado

Forma del ápice del limbo: acuminado

Forma de la base del limbo: obtuso

Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR

Longitud de los pétalos: media

Anchura de los pétalos: media

Disposición de los pétalos: libres entre sí

Longitud del pedúnculo: corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Oidio: ataque medio

Moteado: no presenta

Raíces aéreas: no presenta

Momificado: no presenta

Pulgón lanífero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio

Araña roja: no presenta

Chancro: no presenta