

VARIEDAD CAAVEIRO

1-DESCRIPTORES AGRONÓMICOS

Nº IPGRI	Nº UPOV	CARÁCTER	NIVEL
6.1.1		Habito de crecimiento (3-7)	6. Medio-erecto
4.2.1		Días desde la siembra hasta el espigado	100,5
-	-	Días desde la siembra hasta madurez fisiologica	142,9

2-DESCRIPTORES MORFOLÓGICOS

Nº IPGRI	Nº UPOV	CARÁCTER	NIVEL
-	03	Pigmentación aurículas de banderola (1-9)	1. Nula/Muy débil
-	07	Glauescencia de la espiga (1-9)	3.Débil
4.1.2	-	Altura de la planta (sin barbas)	144 cm
-	10	Sección del tallo (1-9)	1.Hueco
-	14	Presencia de barbas/aristas (Ausencia/Presencia)	Presencia de barbas
4.2.4	16	Color de la espiga (1-3)	2.Rojo/marrón
-	-	Longitud de la espiga en cm (sin barbas)	10,7
4.2.6	-	Número de espiguillas por espiga (sin espiguillas estériles)	18,6
-	-	Longitud del pico de gluma inferior (1-9)	5.Medio (2-5mm)
4.2.5	-	Vellosidad externa de la gluma (0-7)	0.Lampiñas
-	22	Vellosidad interna de la gluma (3-7)	3.Débil
-	26	Tipo de trigo (Invierno/Alternativo/Primavera)	Alternativo
-	-	Color de barbas (Blancas/Negras en base/Negras/Roj-marrón)	Rojas a marrones
-	-	Rugosidad de las barbas (Ásperas/lisas)	Lisas
4.3.1	24	Color de la semilla (Blanco/Rojo-pardo/Purpura)	Rojo-pardo
4.2.2	12	Densidad de la espiga (3-9)	3.Laxa (18,3)
-	-	Color del tallo en madurez fisiológica (Amarillo/Rojo)	Amarillo
4.3.2	-	Tamaño de la semilla (3-9)	5.Intermedia 0,8cm
4.2.3	-	Longitud de las barbas (1-4)	4.Aristas largas>8cm
-	-	Forma del grano (1-5)	3.Ovoide
-	18	Anchura del hombro de la gluma inferior (3-7)	5.Medio
-	19	Forma del hombro de la gluma inferior (1-9)	3.Ligeramente inclinado
-	-	Forma de la gluma inferior (1-9)	5.Ovoide

3-DESCRIPTORES DE CALIDAD

IPGRI	UPOV		
6.3.3	-	Porcentaje de proteína	14,2%
-	-	Peso Hectolítrico o específico	82,1 Kg/Hl
-	-	Volumen de sedimentación por SDS	64,7
-	-	Peso de mil semillas	56,5 g

Nota: Parámetros tomados según la media de 3 años de caracterización